



Endoscopia superior (EGD)

Una gastroscopia (endoscopia o EGD) es un examen muy preciso del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. Esto se logra con el uso de un gastroscopio, un instrumento delgado y flexible que se ilumina y se pasa por la boca. Es posible que le pidan que haga gárgaras con un anestésico local. En preparación para la gastroscopia, se iniciará una vía intravenosa. Una vez que se haya reunido con el médico y haya firmado un formulario de consentimiento, se le administrará un medicamento sedante por vía intravenosa. Estará somnoliento durante el procedimiento, que durará aproximadamente quince minutos. La mayoría de los pacientes toleran muy bien el examen y la medicación a menudo le hace olvidar todo el procedimiento. Este es un examen común y muy seguro con complicaciones potenciales extremadamente raras, como sangrado, perforación o reacción al medicamento.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE:

- **Su procedimiento está programado antes de las 12:00 p.m.**, nada por vía oral después de la medianoche de la noche anterior al procedimiento.
- **Si su procedimiento está programado para las 12:00 p.m. o después**, es posible que tome agua hasta 2 horas antes de la hora de llegada el día de su procedimiento, luego nada por la boca.
- DEBE tener un adulto que lo acompañe a casa después del procedimiento. Todavía debe tener un acompañante, incluso si planea tomar un taxi, The Ride, GLSS Medical Bus, Uber, Lyft o transporte alternativo. No se le permite conducir hasta el día siguiente.
- Si tiene diabetes y/o toma algún medicamento para bajar de peso, revise las instrucciones adjuntas para el manejo de medicamentos. **Si se administra insulina y no ha hablado de esto con nuestra oficina, llame a nuestra oficina de inmediato.**
- Puede tomar sus otros medicamentos matutinos con uno o dos sorbos pequeños de agua. De lo contrario, nada más por vía oral durante dos (2) horas antes de su hora de llegada.
- Si tiene stents cardíacos, antecedentes de accidente cerebrovascular o AIT (ataque isquémico transitorio), **NO DEJE DE TOMAR ASPIRINA**. Si está tomando otros medicamentos antiinflamatorios como Advil, Motrin o Aleve, deténgalos cinco (5) días antes de su procedimiento.
- **Si toma anticoagulantes** [warfarina (Coumadin), clopidogrel (Plavix), aspirina/dipiridamol (Aggrenox), rivaroxabán (Xarelto), apixabán (Eliquis), dabigatrán etexilato (Pradaxa), cangrelor (Kengreal)] **y no ha hablado de esto con nuestra oficina, llame a nuestra oficina de inmediato.**
- Si toma aspirina según lo prescrito por su médico, puede continuar tomándola según las indicaciones.
- Si tiene apnea del sueño y usa un CPAP en casa, asegúrese de llevarlo consigo el día de su cita para la endoscopia.

SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO PARA:

FECHA: _____ HORA DE LLEGADA: _____ PROVEEDOR: _____

UBICACIÓN:

Salem Hospital (81 Highland Avenue, Salem) - Diríjase a la entrada de **endoscopia** (ingrese por la entrada superior en Highland Avenue y siga las señales) para registrarse en la sala de endoscopia.

MGB Healthcare Center (102-104 Endicott Street, Danvers) - Diríjase al Departamento de Cirugía de Día del **2º piso** para registrarse en el Departamento de Cirugía de Día.

Por favor, haga todo lo posible para cumplir con su cita programada. Sabemos que a veces las cosas suceden en el último minuto de la vida, pero notificarnos al menos siete (7) días antes de su cita de endoscopia nos permite ayudar a otro paciente. Llame al 978-741-4171 si tiene alguna pregunta o si necesita reprogramar su procedimiento.